

	<b>PREPARACIÓN PARA DRENAJES PRECUTÁNEOS Y BIOPSIAS DIRIGIDAS</b>	VERSIÓN 2
		VIGENCIA jun-23
		CÓDIGO W-DT-006 MDN
		PÁGINA 7 DE 32

<b>DRENAJES PERCUTÁNEOS Y BIOPSIAS DIRIGIDAS</b>	
<b>AMBULATORIO</b>	<p><b>¿QUÉ ES UN DRENAJE Y BIOPSIA DIRIGIDA?</b></p> <p>Es un procedimiento por medio del cual se saca o toma una muestra (líquido del cuerpo, parte de un órgano o cavidad) a través de una punción (pinchazo) que se hace a la piel con una aguja hueca o catéter percutáneo, se realiza apoyado con la imagen de un ecógrafo o un tomógrafo. La punción con la aguja puede ser un poco dolorosa por lo que se aplica un medicamento llamado anestésico local.</p> <p><b>Para solicitar la cita de su examen debe contar con los siguientes requisitos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disponer de la orden médica.</li> <li>• Disponer de la autorización de servicio de su aseguradora.</li> <li>• Si cuenta con exámenes tomados previamente recuerde presentarlos antes de la realización del examen.</li> <li>• Cancelar copago o cuota moderadora si se requiere.</li> <li>• Si sospecha estar embarazada avise al personal de imangenología.</li> <li>• Si usted está tomando anticoagulantes como la warfarina, coumadin, o antiagregantes como el clopidogrel o aspirina, debe informar al personal de la institución, desde el momento de la solicitud de la cita.</li> </ul> <p><b>PREPARACIÓN Y RECOMENDACIONES</b></p> <p>Estimado usuario, tome nota de las siguientes recomendaciones para llevarlas a cabo:</p> <p><b>EL DÍA ANTERIOR AL EXAMEN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tomar pruebas de coagulación (TP - TPT- INR), hemoglobina y plaquetas el día anterior a la toma de la biopsia, en el caso de que se encuentren alterados informar al radiólogo intervencionista de manera previa para la toma de decisión sobre la realización del procedimiento.</li> <li>• Suspender anticoagulantes de 2 a 3 días antes del examen.</li> </ul>
	<p><b>EL DÍA DEL EXAMEN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acudir con acompañante adulto.</li> <li>• Acudir en ayuno.</li> <li>• Presentar los reportes de laboratorios tomados recientemente, con un tiempo no mayor a 5 días.</li> <li>• Disponer de la historia clínica o epicrisis si es posible.</li> <li>• Si cuenta con imágenes tomadas previamente, presentarlos al radiólogo antes de la realización del procedimiento.</li> <li>• Preséntese en la Clínica Medilaser S.A.S. Calle 6a # 14 A - 55, 20 minutos antes del examen en la ventanilla de imangenología con la orden médica, autorización vigente y valor del copago, si aplica.</li> <li>• Para mayor información comunicarse al 6084366000 extensión 2307.</li> </ul> <p><b>POSTERIOR AL EXAMEN:</b></p> <p>Recordamos que si su biopsia fue tomado con anestesia local, deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iniciar dieta líquida, según tolerancia y continuar con dieta normal.</li> <li>• No realizar actividades físicas que sobrelleven exceso de fuerza o sobrecarga física.</li> <li>• Usar medios físicos para el control del dolor, como colocación de hielo en zona de punción.</li> <li>• Usar analgésicos orales según prescripción médica (tener en cuenta alergias a medicamentos).</li> <li>• Reposar y permanecer bajo vigilancia de un adulto las siguientes 4 horas, puede sentirse mareado o cansado.</li> <li>• Vigilar la aparición de signos de alarma como, dolor agudo, inflamaciones, sangrado. Si alguno de estos síntomas son de difícil manejo y persiste acuda al servicio de urgencias de su aseguradora.</li> <li>• El informe médico será entregado inmediatamente posterior al procedimiento.</li> </ul>
	<a href="#">REGRESAR</a>

<b>DRENAJES PERCUTÁNEOS Y BIOPSIAS DIRIGIDAS</b>	
<b>HOSPITALARIO</b>	<p><b>PREPARACIÓN PARA DRENAJES PRECUTÁNEOS Y BIOPSIAS DIRIGIDAS</b></p> <p><b>¿QUÉ ES UN DRENAJE Y BIOPSIA DIRIGIDA?</b></p> <p>Es un procedimiento por medio del cual se saca o toma una muestra (líquido del cuerpo, parte de un órgano o cavidad) a través de una punción (pinchazo) que se hace a la piel con una aguja hueca o catéter percutáneo, se realiza apoyado con la imagen de un ecógrafo o un tomógrafo. La punción con la aguja puede ser un poco dolorosa por lo que se aplica un medicamento llamado anestésico local.</p> <p><b>Para solicitar la realización del examen debe:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar la verificación redundante de los datos del paciente.</li> <li>• Verificar en la evolución médica de la historia clínica que se encuentre ordenado el procedimiento.</li> <li>• Verificar si el examen se encuentra cargado en módulo de procedimientos no quirúrgicos.</li> <li>• Solicite la realización de la biopsia o drenaje guiado por ecografía al número 6088724100 a la extensión 2307 y guiado por tomografía a la extensión 2306, según orden médica y especificaciones redactadas en campo de observaciones.</li> </ul> <p><b>RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO DEL PACIENTE</b></p> <p><b>EL EQUIPO DE ENFERMERÍA DEBE:</b></p> <p><b>ANTES DEL EXAMEN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tomar pruebas de coagulación (TP - TPT- INR), hemoglobina y plaquetas el día anterior a la toma de la biopsia, en el caso de que se encuentren alterados informar al radiólogo intervencionista de manera previa para la toma de decisión sobre la realización del procedimiento.</li> <li>• Suspender anticoagulante, aspirina o sus derivados (Mejoral, Asawin, AlkaSeltzer) 5 días antes.</li> </ul> <p><b>EL DÍA DEL EXAMEN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enviar el paciente en camilla, con acompañante y camillero.</li> <li>• En caso de paciente con biopsia pulmonar, enviar en camilla en</li> </ul> <p><b>POSTERIOR AL EXAMEN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Retirar el apósito del sitio de toma de la biopsia o drenaje a las 24 horas, no humedecerlo.</li> <li>• Evitar realizar esfuerzos durante 48 horas.</li> <li>• Control de tensión arterial cada 15 minutos por 2 horas.</li> <li>• Vigilar patrón respiratorio.</li> <li>• Solicitar dieta según orden médica.</li> <li>• El resultado del examen será entregado en un plazo de 6 horas para pacientes con condición de salud no urgente y en un plazo de 2 horas para pacientes con condición de salud uroente.</li> </ul> <p><i>Una vez se encuentre el paciente en el servicio de ecografía se le debe explicar el procedimiento, junto a su familiar o representante y solicitar la firma del consentimiento informado.</i></p>