

	<b>PREPARACIÓN PARA COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE)</b>	VERSIÓN VIGENCIA CÓDIGO PÁGINAS	2 jun-23 W-DT-058 MDF 25 DE 32
--	---	--	---

**AMBULATORIO**

<b>COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA</b>	
<p><b>¿QUÉ ES UNA COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) ?</b></p> <p>La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica o CPRE es una técnica especializada que se usa para estudiar los conductos de la vesícula, el páncreas y el hígado a través de un endoscopio. La exploración se realiza con el paciente acostado sobre la mesa de radiología, se le inyecta un fármaco sedante que le producirá sueño, posteriormente se introduce a través de la boca el endoscopio, pasando por el esofago, estómago y llegando hasta una porción del intestino delgado denominada duodeno. Se inyectará un tinte especial y se tomarán radiografías.</p> <p>Durante la exploración usted puede notar molestias a nivel de la garganta y del abdomen, así como sensación de náuseas y eructos, que son pasajeros y ceden en la mayoría de las veces espontáneamente.</p> <p><b>Para solicitar la cita de su examen debe contar con los siguientes requisitos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disponer de la orden médica.</li> <li>• Disponer de la autorización de servicio de su aseguradora.</li> <li>• Si cuenta con exámenes tomados previamente recuerde presentarlos antes de la realización del examen.</li> <li>• Asista 30 minutos antes de la hora asignada.</li> <li>• Cancelar copago o cuota moderadora si se requiere.</li> <li>• Si sospecha estar embarazada avise al personal de endoscopia.</li> <li>• Si usted es alérgico a algún medicamento, notifíquelo al momento de solicitar su cita.</li> <li>• Si usted está tomando anticoagulantes como la warfarina, coumadin, o antiagregantes como el clopidogrel o aspirina, debe informar al personal de la institución, desde el momento de la solicitud de la cita.</li> <li>• El paciente debe tener reporte de los siguientes exámenes: Ecografía hepática, fosfatasa alcalina, bilirrubinas, TAC abdominal, Glicemia, PT, PTT, cuadro hemático, BUN, creatinina, transaminasas, electrocardiograma.</li> </ul> <p><b>PREPARACIÓN Y RECOMENDACIONES</b> Estimado usuario, tome nota de las siguientes recomendaciones para llevarlas a cabo:</p>	<p><b>EL DÍA ANTERIOR AL EXAMEN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consuma al desayuno dieta líquida, como caldos bajo nivel en grasas, jugos de frutas colados como jugos de manzanas, limón, maracuyá, lulo, gelatinas, suero de colores claros.</li> <li>• NO consuma líquidos o gelatina color rojo o púrpura, leche y sus derivados, bebidas alcohólicas.</li> <li>• Evitar el consumo de frutas con semillas mínimo 5 días previos al examen, como granadillas, pitahaya, papayas, sandías, entre otras.</li> <li>• Debe tener un ayuno de 8 horas como mínimo previo a la realización del procedimiento.</li> <li>• Tome en la noche anterior cualquier medicación que venga consumiendo, excepto anticoagulantes o aspirina los cuales deben ser suspendidos 8 días antes, esto para poder tomar biopsias si se llegasen a requerir y reducir el riesgo de sangrado.</li> <li>• No tomar antídicos.</li> </ul> <p><b>EL DÍA DEL EXAMEN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si es hipertenso y/o sufre de tiroides, consumir su medicamento a las 5:30 de la mañana del día del examen con poca agua.</li> <li>• No consuma ningún alimento antes del examen según las indicaciones dadas anteriormente.</li> <li>• Realice una adecuada higiene oral.</li> <li>• Si usted está tomando anticoagulantes como la warfarina, coumadin, o antiagregantes como el clopidogrel o aspirina, debe informar al personal de la institución.</li> <li>• Acudir con un acompañante adulto (mayor de edad), con las uñas de las manos y la boca sin maquillaje, después del procedimiento no puede conducir vehículos.</li> <li>• Presentarse en la Clínica MediLaser S.A.S. Sucursal Florencia en la dirección calle 6 # 14A-55 barrio Juan XIII en la unidad de endoscopia.</li> <li>• Para mayor información comunicarse al 6084366000 extensión 2121.</li> </ul> <p><b>POSTERIOR AL EXAMEN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El resultado de su examen será entregado inmediatamente después del examen.</li> <li>• Puede sentir molestias al ingerir alimentos o al hacer deposiciones según sea el caso, sin embargo esto es autolimitado.</li> </ul>

[REGRESAR](#)

**HOSPITALARIO**

<b>COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA</b>	
<p><b>¿QUÉ ES UNA COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) ?</b></p> <p>La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica o CPRE es una técnica especializada que se usa para estudiar los conductos de la vesícula, el páncreas y el hígado a través de un endoscopio. La exploración se realiza con el paciente acostado sobre la mesa de radiología, se le inyecta un fármaco sedante que le producirá sueño, posteriormente se introduce a través de la boca el endoscopio, pasando por el esofago, estómago y llegando hasta una porción del intestino delgado denominada duodeno. Se inyectará un tinte especial y se tomarán radiografías.</p> <p>Durante la exploración usted puede notar molestias a nivel de la garganta y del abdomen, así como sensación de náuseas y eructos, que son pasajeros y ceden en la mayoría de las veces espontáneamente.</p> <p><b>Para solicitar la realización del examen debe:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar la verificación redundante de los datos del paciente. Verificar que en la evolución médica de la historia clínica se encuentre ordenado la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica ( CPRE ).</li> <li>• Verificar si la orden se encuentra cargada en módulo de procedimientos no quirúrgicos.</li> <li>• Gestionar y confirmar autorización de la CPRE con salida y seguimiento.</li> <li>• Solicite a gastroenterología, extensión 2121, la realización del procedimiento, según orden médica y especificaciones redactadas en campo de observaciones.</li> <li>• Solicitar los exámenes correspondientes.</li> <li>• Solicitar la valoración pre-anestésica.</li> </ul> <p><b>RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO DEL PACIENTE</b></p> <p><b>EL EQUIPO DE ENFERMERÍA DEBE:</b> <b>EL DÍA ANTERIOR AL EXAMEN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alistar reportes de exámenes (Ecografía hepática, Fosfatasa alcalina, bilirrubinas, glicemia, BUN, creatinina, PT, PTT, cuadro hemático, transaminasas).</li> </ul>	<p><b>VERSIÓN</b> <b>VIGENCIA</b> <b>CÓDIGO</b> <b>PÁGINAS</b></p> <p>2 jun-23 W-DT-058 MDF 25 DE 32</p> <p><b>EL DÍA DEL EXAMEN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En el caso de que los tiempos de coagulación se encuentren alterados se deberá informar de manera previa al especialista encargado de realizar el procedimiento para decidir la pertinencia de la realización del examen.</li> <li>• No administrar anticoagulantes y/o aspirina. Si se requiere tomar biopsia de deben suspender estos medicamentos 8 días antes del examen (esta indicación se debe revisar con médico tratante).</li> </ul> <p><b>EL DÍA DEL EXAMEN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enviar al paciente con el camillero y un acompañante en camilla o silla de ruedas según necesidad al área de cirugía.</li> <li>• Verificar que estén firmados consentimiento informado del procedimientos a realizar</li> <li>• Garantizar ayuno de 8 horas.</li> <li>• Garantice la disponibilidad de un acceso venoso en miembro superior derecho con catéter número 18 Fr.</li> <li>• Si el paciente requiere tomar un medicamento, lo deberá hacer a las 06:00 de la mañana con una pequeña cantidad de agua.</li> <li>• Enviar al paciente sin joyas, prótesis dental, ni esmalte en las uñas.</li> <li>• Enviar al paciente con un familiar o acompañante.</li> <li>• Enviar al paciente con una adecuada higiene oral.</li> <li>• Administrar una hora antes del examen profilaxis antibiótica según protocolo, si paciente no viene recibiendo antibióticos.</li> </ul> <p><b>POSTERIOR AL EXAMEN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El resultado del examen se entrega posterior a la terminación del estudio.</li> <li>• Permitir un tiempo de recuperación mínimo de 6 horas, por lo tanto el paciente no debe levantarse durante este tiempo.</li> <li>• Solicitar al paciente dieta según orden médica.</li> <li>• Si el paciente requirió sedación, no administrar líquidos hasta 30 minutos después del procedimiento.</li> <li>• Reanude la administración de medicamentos ordenados.</li> <li>• En caso de tener muestra para patología, realizar a respectiva gestión.</li> </ul>

[REGRESAR](#)