

	NEFROSTOMÍA PERCUTÁNEA	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	jun-23
		CODIGO	W-DT-058 MDF
		PAGINA	9 DE 32

NEFROSTOMÍA PERCUTÁNEA			
AMBULATORIO	¿QUÉ ES UNA NEFROSTOMÍA PERCUTÁNEA? Procedimiento realizado por radiólogo intervencionista que consiste en la colocación de un catéter en el interior de la pelvis renal mediante una punción a través de la piel, guiada por algún método de imagen (ultrasonido, tomografía computarizada o fluoroscopia). Las principales indicaciones de la nefrostomía son: Uropatía obstructiva (85-90%), litiasis es la más frecuente, coágulos de sangre, fibrosis postquirúrgica o enfermedad maligna como cáncer cervicouterino, masas adenopáticas, cáncer de próstata.	EL DÍA DEL EXAMEN: <ul style="list-style-type: none"> • Asistir en ayunas. • Llevar el reporte de • Asistir con un acompañante adulto. • Presentar resumen de la historia clínica. • Preséntese en la Clínica Medilaser S.A.S. Calle 6a # 14 A - 55, 20 minutos antes del examen en la ventanilla de imagenología con la orden médica, autorización vigente y valor del copago, si aplica. • Para mayor información comunicarse al 6084366000 extensión 2106. 	
	Para solicitar la cita para este procedimiento debe contar con los siguientes requisitos: <ul style="list-style-type: none"> • Disponer de la orden médica. • Disponer de la autorización de servicio de su aseguradora. • Si cuenta con radiografías u otros exámenes tomados previamente, recuerde traerlos y presentarlos antes de la realización del examen. • Cancelar copago o cuota moderadora, si se requiere. • Si sospecha estar embarazada avise al personal de radiología • Si el paciente se encuentra hospitalizado el personal del servicio se encargara de los trámites administrativos para la realización del examen. 	POSTERIOR AL EXAMEN: <ul style="list-style-type: none"> • Recordamos si su drenaje fue tomado bajo anestesia local. • Favor, tener en cuenta las siguientes recomendaciones: • Iniciar dieta líquida, según tolerancia continuar con dieta normal. • No realizar actividades físicas que sobreleven exceso de fuerza o sobrecarga física. • Usar medios físicos para el control del dolor (colocación de hielo en zona de punción). • Usar analgésicos orales según prescripción médica (tener en cuenta alergias a medicamentos). • Reposar y permanecer bajo vigilancia de un adulto las siguientes 4 horas, puede sentirse mareado o cansado. • Vigilar la aparición de signos de alarma como, dolor agudo, inflamaciones, sangrado. Si alguno de estos síntomas son de difícil manejo y persiste acuda al servicio de urgencias de su aseguradora. • El informe médico será entregado inmediatamente posterior al procedimiento. 	
	PREPARACIÓN Y RECOMENDACIONES Estimado usuario, tome nota de las siguientes recomendaciones para llevarlas a cabo:		
	ANTES DEL EXAMEN: <ul style="list-style-type: none"> • Historia clínica de valoración pre-anestésica. • Realizarse los exámenes solicitados por anestesiólogo y/o tiempos de coagulación. • Si consume medicamentos hipertensivos NO suspender. <ul style="list-style-type: none"> • Suspender medicamentos anticoagulantes 2 a 3 días antes del examen. 		REGRESAR

	NEFROSTOMÍA PERCUTÁNEA	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	jun-23
		CODIGO	W-DT-058 MDF
		PAGINA	9 DE 32

NEFROSTOMÍA PERCUTÁNEA			
HOSPITALARIO	¿QUÉ ES UNA NEFROSTOMÍA PERCUTÁNEA? Procedimiento realizado por radiólogo intervencionista que consiste en la colocación de un catéter en el interior de la pelvis renal mediante una punción a través de la piel, guiada por algún método de imagen (ultrasonido, tomografía computarizada o fluoroscopia). Las principales indicaciones de la nefrostomía son: Uropatía obstructiva (85-90%), litiasis es la más frecuente, coágulos de sangre, fibrosis post-quirúrgica o enfermedad maligna como cáncer cervicouterino, masas adenopáticas, cáncer de próstata.	<ul style="list-style-type: none"> • Suspender anticoagulante, aspirina o sus derivados (Mejoral, Asawin, AlkaSeltzer) 5 días antes. 	
	Para solicitar la realización del examen debe: <ul style="list-style-type: none"> • Realizar la verificación redundante de los datos del paciente. • Verificar que el procedimiento se encuentre ordenado en la evolución médica de la historia clínica. • Verificar que la orden se encuentra cargada en procedimiento no quirúrgico de la historia clínica. • Solicite la realización de la nefrostomía percutánea a la extensión 2307 según orden médica y especificaciones redactadas en campo de observaciones. 	EL DÍA DEL EXAMEN: <ul style="list-style-type: none"> • Enviar el paciente en camilla, con acompañante y camillero. • No ingerir alimentos 4 horas previas al procedimiento. • Enviar los siguientes insumos: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 1 Catéter 8 Fr. ✓ 2 Jeringas de 50 ml ✓ 1 Par de guantes estériles talla 7 1/2. ✓ 1 Equipo Macrogoteo ✓ 1 Cystoflo. ✓ 1 Hoja de Bisturí N° 11. ✓ 1 Seda 2/0 con aguja recta. 	
	RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO DEL PACIENTE EL EQUIPO DE ENFERMERÍA DEBE: ANTES DEL EXAMEN: <ul style="list-style-type: none"> • Tomar pruebas de coagulación (TP - TPT- INR), hemoglobina y plaquetas el día anterior a la toma de la biopsia, en el caso de que se encuentren alterados informar al radiólogo intervencionista de manera previa para la toma de decisión sobre la realización del procedimiento. 	POSTERIOR AL EXAMEN: <ul style="list-style-type: none"> • Retirar el apósito del sitio puncionado a las 24 horas, no humedecerlo. • Evitar realizar esfuerzos respiratorios durante 48 horas. • Si aparece dolor administrar analgésicos ordenados según orden médica. • Control de tensión arterial cada 15 minutos por 2 horas. • Solicitar dieta según evolución médica. • El reporte del procedimiento será entregado inmediatamente después de terminarlo. 	