

	PREPARACIÓN PARA PARACENTESIS	VERSTION 2 VIGENCIA jun-23 CÓDIGO W-DT-058 MDF PAGINA 10 DE 32
---	--------------------------------------	---

AMBULATORIO

PARACENTESIS	
<p>¿QUÉ ES UNA PARACENTESIS?</p> <p>Una paracentesis abdominal implica la punción de la cavidad abdominal con una aguja y la colocación de un catéter para la extracción del exceso de líquido. El procedimiento puede ser diagnóstico o terapéutico.</p> <p>Para solicitar la cita de su examen debe contar con los siguientes requisitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disponer de la orden médica. • Disponer de la autorización de servicio de su aseguradora. • Si cuenta con radiografías u otros exámenes tomados previamente, recuerde traerlos y presentarlos antes de la realización del examen. • Cancelar copago o cuota moderadora, si se requiere. • Si sospecha estar embarazada avise al personal de imagenología, antes de la toma del examen. <p>PREPARACIÓN Y RECOMENDACIONES</p> <p>Estimado usuario, tome nota de las siguientes recomendaciones para llevarlas a cabo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si consume medicamentos hipertensivos, NO es necesario suspenderlos. 	<p>EL DÍA DEL EXAMEN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asistir en ayunas. • Llevar el reporte de tiempos de coagulación. • Asistir con un acompañante adulto. • Presentar resumen de la historia clínica. • Preséntese en la Clínica Medilaser S.A.S. Calle 6a # 14 A - 55, 20 minutos antes del examen en la ventanilla de imagenología con la orden médica, autorización vigente y valor del copago, si aplica. <p>Para mayor información comuníquese al 6084366000 extensión 2307.</p> <p>POSTERIOR AL EXAMEN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recordamos si su drenaje fue tomado bajo anestesia local. • Favor, tener en cuenta las siguientes recomendaciones: <ul style="list-style-type: none"> • Iniciar dieta líquida, según tolerancia continuar con dieta normal. • No realizar actividades físicas que sobrelleven exceso de fuerza o sobrecarga física. • Usar medios físicos para el control del dolor (colocación de hielo en zona de punción). • Usar analgésicos orales según prescripción médica (tener en cuenta alergias a medicamentos). • Reposar y permanecer bajo vigilancia de un adulto las siguientes 4 horas, puede sentirse mareado o cansado. • Vigilar la aparición de signos de alarma como, dolor agudo, inflamaciones, sangrado. Si alguno de estos síntomas son de difícil manejo y persiste acuda al servicio de urgencias de su aseguradora.

[REGRESAR](#)

HOSPITALARIO

PARACENTESIS	
<p>¿QUÉ ES UNA PARACENTESIS GUIADA POR ECOGRAFÍA?</p> <p>Una paracentesis abdominal implica la punción de la cavidad abdominal con una aguja y la colocación de un catéter para la extracción del exceso de líquido. El procedimiento puede ser diagnóstico o terapéutico.</p> <p>Para solicitar la realización del examen debe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizar la verificación redundante de los datos del paciente. • Verificar que el procedimiento se encuentre ordenado en la evolución médica de la historia clínica. • Verificar que la orden se encuentra cargada en procedimiento no quirúrgico de la historia clínica. • Solicite la realización de la paracentesis guiada por ecografía, a la extensión 2307 según orden médica y especificaciones redactadas en campo de observaciones. <p>RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO DEL PACIENTE</p> <p>EL EQUIPO DE ENFERMERÍA DEBE:</p> <p>ANTES DEL EXAMEN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tomar pruebas de coagulación (TP - TPT- INR), hemoglobina y plaquetas el día anterior a la toma de la biopsia, en el caso de que se encuentren alterados informar al radiólogo intervencionista de manera previa para la toma de decisión sobre la realización del procedimiento. • Suspender anticoagulante, aspirina o sus derivados (Mejoral, Asawin, AlkaSeltzer) 5 días antes. 	<p>EL DÍA DEL EXAMEN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enviar el paciente en camilla, con acompañante y camillero. • No ingerir alimentos 4 horas previas al procedimiento. • Enviar los siguientes insumos: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 1 Catéter Nº 14. ✓ 2 Jeringas de 50 ml. ✓ 1 Par de guantes estériles 7 1/2. ✓ 1 Lidocaina al 2%. ✓ 2 Jeringas de 10ml. ✓ 1 Llave de 3 vías. ✓ 1 Extensión de anestesia. <p><i>Una vez se encuentre el paciente en el servicio de ecografía se le debe explicar el procedimiento, junto a su familiar o representante y solicitar la firma del consentimiento informado.</i></p> <p>POSTERIOR AL EXAMEN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Retirar el apósito del sitio puncionado a las 24 horas, no humedecerlo. • Evitar realizar esfuerzos respiratorios durante 48 horas. • Si aparece dolor administrar analgésicos según orden médica. • Control de tensión arterial cada 15 minutos por 2 horas. • El reporte del procedimiento será entregado inmediatamente después de terminarlo.

[REGRESAR](#)