
	PREPARACIÓN PARA RECTOSIGMOIDOSCOPIA	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	jun-23
		CÓDIGO	W-DT-058 MDF
		PÁGINAS	26 DE 32

RECTOSIGMOIDOSCOPIA	
AMBULATORIO	<p><b>¿QUÉ ES UNA RECTOSIGMOIDOSCOPIA?</b></p> <p>La rectosigmoidoscopia es una exploración médica durante la cual se inspeccionan las paredes de la parte final del colon, el recto y el sigmoide, en busca de posibles crecimientos anormales, llamados pólipos o tumores en las primeras fases.</p> <p><b>Para solicitar la cita de su examen debe contar con los siguientes requisitos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disponer la orden médica.</li> <li>• Disponer de la autorización de servicio de su aseguradora.</li> <li>• Si cuenta con radiografías u otros exámenes tomados previamente recuerde traerlos y presentarlos antes de la realización del examen.</li> <li>• Cancelar copago o cuota moderadora si se requiere.</li> <li>• Si sospecha estar embarazada avise al personal de endoscopia.</li> <li>• Si usted es alérgico a cualquier medicamento o a cualquier sustancia, infórmele al momento de pedir la cita.</li> </ul> <p><b>PREPARACIÓN Y RECOMENDACIONES</b></p> <p>Estimado usuario, tome nota de las siguientes recomendaciones para llevarlas a cabo:</p> <p><b>EL DÍA ANTES DEL EXAMEN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consumir dieta totalmente líquida, es decir caldos sin grasa, jugos sin leche, aromática, agua panela, gatorade.</li> <li>• Debe mantenerse hidratado.</li> <li>• La noche antes del examen evitará consumir alimentos sólidos .</li> </ul>
	<p><b>EL DÍA DE EL EXAMEN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adquirir enema travad (rectal x 133 ml) dos sobres. Aplicar un enema por vía rectal 4 horas antes de la hora programada del examen y aplicar el otro enema una hora y media después del primero (es decir, 2 y media horas antes de la hora programada del examen).</li> <li>• Debe venir acompañado(a) OBLIGATORIAMENTE por una persona mayor de edad, responsable directamente del paciente, quien debe esperar todo el tiempo del examen.</li> <li>• Debe venir en ayunas.</li> <li>• Asistir 30 minutos antes de la hora asignada.</li> <li>• Dejar de tomar aspirina (si la toma a diario), 8 (ocho) días antes de la fecha del examen.</li> <li>• Asistir con ropa cómoda y zapatos tenis deportivos.</li> <li>• No traiga alhajas (aretes, anillos, pulseras, collares e incluso reloj) al examen.</li> <li>• Si usted toma medicamentos para la tensión arterial o tiroxina para hipotiroidismo debe tomar los medicamentos normalmente con poca agua incluso el día del examen.</li> <li>• Si usted es diabético(a) y toma medicamentos o se aplica insulina, el día del examen no los tome ni se aplique la insulina hasta después de realizar el procedimiento.</li> <li>• Si usted es diabético y/o alérgico a cualquier medicamento o sustancia, informe al personal del área.</li> <li>• Recuerde traer en regla sus papeles para el procedimiento: autorización del procedimiento, fotocopia de su cédula y su carné vigente.</li> </ul> <p>• Presentarse en la Clínica Medilaser S.A.S. Sucursal Florencia en la dirección calle 6 # 14A-55 barrio Juan XIII en la unidad de endoscopia.</p> <p>• Para mayor información comunicarse al 6084366000 extensión 2121.</p> <p><b>POSTERIOR AL EXAMEN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puede sentir molestias al ingerir alimentos o al hacer deposiciones según sea el caso.</li> <li>• Si su examen será realizado con sedación, evite programar cosas importantes después de este.</li> <li>• Debe evitar conducir.</li> </ul>
	<b>REGRESAR</b>

	PREPARACIÓN PARA RECTOSIGMOIDOSCOPIA	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	jun-23
		CODIGO	W-DT-058 MDF
		PAGINAS	26 DE 32
RECTOSIGMOIDOSCOPIA			
HOSPITALARIO	<p><b>¿QUÉ ES UNA RECTOSIGMOIDOSCOPIA?</b></p> <p>La rectosigmoidoscopia es una exploración médica durante la cual se inspeccionan las paredes de la parte final del colon, el recto y el sigmoide, en busca de posibles crecimientos anormales, llamados pólipos o tumores en las primeras fases.</p> <p><b>Para solicitar la realización del examen debe:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Realizar la verificación redundante de los datos del paciente.</li><li>• Verificar si la orden se encuentra cargada en módulo de procedimientos no quirúrgicos.</li><li>• Gestionar y confirmar autorización de la rectosigmoidoscopia con salida y seguimiento.</li><li>• Solicite a gastroenterología, extensión 2121, la realización de la rectosigmoidoscopia, según orden médica y especificaciones redactadas en campo de observaciones.</li></ul> <p><b>RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO DEL PACIENTE</b></p> <p><b>EL EQUIPO DE ENFERMERÍA DEBE:</b></p> <p><b>EL DÍA ANTES DEL EXAMEN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Administrar dieta totalmente líquida, es decir caldos sin grasa, jugos sin leche, aromática, agua panela, gatorade.</li><li>• Mantener al paciente bien hidratado.</li><li>• Indicar al paciente que debe permanecer en ayuno hasta el momento de la realización del examen.</li><li>• La noche antes del examen no suministrar alimentos sólidos al paciente.</li><li>• Suspender la administración de anticoagulantes, con el fin de reducir el riesgo de sangrado durante la toma de biopsias durante el examen.</li></ul>	<p><b>EL DÍA DEL EXAMEN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Administrar enema travad (rectal x 133 ml) dos sobres, un enema por vía rectal 4 horas antes de la hora programada del examen y el otro enema una hora y media después del primero (es decir, 2 y media horas antes de la hora programada del examen).</li><li>• Enviar al paciente con el camillero y un acompañante en camilla o silla de ruedas según necesidad.</li><li>• Solicitar acompañante para el paciente.</li><li>• Garantizar ayuno.</li><li>• Administrar los medicamentos para la tensión arterial o tiroxina para hipotiroidismo con poca agua el día del examen.</li><li>• En pacientes diabéticos, no administrar medicamentos el día del examen, sino hasta después de realizar el procedimiento.</li></ul> <p><b>POSTERIOR AL EXAMEN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Solicitar al paciente dieta según orden médica.</li><li>• El resultado del examen será entregado inmediatamente después del examen.</li><li>• Solicitar dieta al paciente según orden médica, no administrar líquidos hasta 30 minutos después del procedimiento.</li><li>• Realizar seguimiento a los signos vitales del paciente durante la primera hora después de la toma del examen.</li><li>• Reanudar la administración de medicamentos ordenados.</li><li>• En caso de tener muestra para patología, realizar a respectiva gestión para envió de la misma a estudio.</li></ul>	
	<div>REGRESAR</div>		