

	PREPARACIÓN PARA TORACENTESIS	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	jun-23
		CÓDIGO	W-DT-058 MDF
		PÁGINA	11 DE 32

AMBULATORIO	<p align="center">TORACENTESIS</p>		
	¿QUÉ ES UNA TORACENTESIS?	EL DÍA DEL EXAMEN:	
	<p>La toracentesis es un procedimiento que se realiza para retirar el líquido del espacio pleural con fines terapéuticos y de esta manera aliviar los síntomas de la acumulación de líquidos, también es diagnóstica para detectar la causa de la acumulación de líquidos.</p> <p>Para solicitar la cita de su examen debe contar con los siguientes requisitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disponer de la orden médica. • Disponer de la autorización de servicio de su aseguradora. • Si cuenta con radiografías u otros exámenes tomados previamente, recuerde traerlos y presentarlos antes de la realización del examen. • Cancelar copago o cuota moderadora, si se requiere. • Si sospecha estar embarazada avise al personal de imagenología, antes de la toma del examen. <p>PREPARACIÓN Y RECOMENDACIONES</p> <p>Estimado usuario, tome nota de las siguientes recomendaciones para llevarlas a cabo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si consume medicamentos hipertensivos, NO es necesario suspenderlos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Asistir en ayunas. • Llevar el reporte de tiempos de coagulación. • Asistir con un acompañante adulto. • Presentar resumen de la historia clínica. • Preséntese en la Clínica Medilaser S.A.S. Calle 6a # 14 A - 55, 20 minutos antes del examen en la ventanilla de imagenología con la orden médica, autorización vigente y valor del copago, si aplica. <p>Para mayor información comuníquese al 6084366000 extensión 2307.</p> <p>POSTERIOR AL EXAMEN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recordamos si su drenaje fue tomado bajo anestesia local. • Favor, tener en cuenta las siguientes recomendaciones: • Iniciar dieta líquida, según tolerancia continuar con dieta normal. • No realizar actividades físicas que sobrelleven exceso de fuerza o sobrecarga física. • Usar medios físicos para el control del dolor (colocación de hielo en zona de punción). • Usar analgésicos orales según prescripción médica (tener en cuenta alergias a medicamentos). • Reposar y permanecer bajo vigilancia de un adulto las siguientes 4 horas, puede sentirse mareado o cansado. • Vigilar la aparición de signos de alarma como, dolor agudo, inflamaciones, sangrado. Si alguno de estos síntomas son de difícil manejo y persiste acuda al servicio de urgencias de su aseguradora. 	

[REGRESAR](#)

	PREPARACIÓN PARA TORACENTESIS	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	jun-23
		CÓDIGO	W-DT-058 MDF
		PÁGINA	11 DE 32

HOSPITALARIO	<p align="center">TORACENTESIS</p>		
	¿QUÉ ES UNA TORACENTESIS?	EL DÍA DEL EXAMEN:	
	<p>La toracentesis es un procedimiento que se realiza para retirar el líquido del espacio pleural con fines terapéuticos y de esta manera aliviar los síntomas de la acumulación de líquidos, también es diagnóstica para detectar la causa de la acumulación de líquidos.</p> <p>Para solicitar la realización del examen debe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizar la verificación redundante de los datos del paciente. • Verificar que el procedimiento se encuentre ordenado en la evolución médica de la historia clínica. • Verificar que la orden se encuentra cargada en procedimiento no quirúrgico de la historia clínica. • Solicite la realización de la toracentesis guiada por ecografía, a la extensión 2307 según orden médica y especificaciones redactadas en campo de observaciones. <p>RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO DEL PACIENTE</p> <p>EL EQUIPO DE ENFERMERÍA DEBE:</p> <p>ANTES DEL EXAMEN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tomar pruebas de coagulación (TP - TPT- INR), hemoglobina y plaquetas el día anterior a la toma de la biopsia, en el caso de que se encuentren alterados informar al radiólogo intervencionista de manera previa para la toma de decisión sobre la realización del procedimiento. • Suspender anticoagulante, aspirina o sus derivados (Mejoral, Asawin, AlkaSeltzer) 5 días antes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Enviar el paciente en camilla, con acompañante y camillero. • No ingerir alimentos 4 horas previas al procedimiento. • Enviar los siguientes insumos: <ul style="list-style-type: none"> ✓1 Catéter Nº 14. ✓1 Jeringa de 50 ml. ✓1 Par guantes estériles talla 7 1/2. ✓1 ampolla de Lidocaína al 2% sin epinefrina x 10 ml. ✓1 Jeringa de 10 ml. ✓1 Equipo de macrogoteo. ✓1 Cistoflo. ✓Si el paciente es de contextura gruesa, solicitar catéter de 10 Fr. <p><i>Una vez se encuentre el paciente en el servicio de ecografía se le debe explicar el procedimiento, junto a su familiar o representante y solicitar la firma del consentimiento informado.</i></p> <p>POSTERIOR AL EXAMEN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tomar radiografía de tórax. • Retirar el apósito del sitio del drenaje a las 24 horas, no humedecerlo. • Evitar realizar esfuerzos durante 48 horas. • Si aparece dolor, administrar analgésicos según orden médica. • Control de tensión arterial cada 15 minutos por 2 horas. • Vigilar patrón respiratorio. • Solicitar dieta según orden médica. • El reporte del procedimiento será entregado inmediatamente después de realizarlo. 	

[REGRESAR](#)